

Additions à la flore Valaisanne

PAR LE DR H. CHRIST

Helianthemum salicifolium (L) Miller

var. **Farquetii** var. nova.

Differt a typo radice valida ramosa *perenni*, ex capite caules tam steriles quam fertiles *numerosos* cœspitosos emittente, caulibus basi *decumbentibus*, infra *valde foliosis*, supra patulis demum erectis, ante anthesin nutantibus sæpe *ramosis*.

Planta habitu ad *H. Chamæcistum* Mill. accedente ideoque hybridam æmulante, sed characteres ultiores inprimis florales haud præbente, ideoque melius pro varietate censenda.

Typus radice tenui simplici annua, non incrassata, cauli sub-simplici raro semirameo basi defoliato aut paucifolio vix arcuato cæterum strictissimo diversus.

Hab. Pente rocheuse sous Creux du Loup sur Branson, alt. env. 700 m. en soc. de *Helianth. vulgare* var. *obscurum*. (i. e. *Chamæcistus* Mill.), gazons compacts. 10 Mai 1919. leg Ph. Farquet.

Riehen, 10 Janvier 1920.

H. CHRIST.

Tulipa Didieri Jord. var. **Bessei** nov. var.

Differt sepalis majoribus latioribus obtusioribus citrinis, macula basali deficiente aut oblitterata, sed versus antheseos finem rubescentibus a margine versus centrum sepalorum, demum fere purpureis. Cetera a typo non diversa.

Hab. Riddes au jardin de M. le Chanoine Besse, et selon lui, aussi dans les autres jardins du dit village. Mai 1919.

Obs. Remarquable comme mutation probable de *T. Didieri* type. J'ai vu une forme assez semblable au jardin botanique à Lausanne, où M. le professeur Wilczek me disait que le type de *T. Didieri* subit facilement de tels changements.

Remarquable aussi par l'analogie de formes semblables qui se trouvent à Aime (Tarentaise) et que Perrier de la Bathie a décrites comme espèces.

H. CHRIST.

Artemisia Absinthium × vallesiaca A. Christii
Besse nov. hybr.

Caulibus pluribus arcuato-ascendentibus 6 dec. et ultra longis valde ramosis, ramis elongatis 1 dec. et ultra longis scopariis erecto-patentibus subsimplicibus.

Foliis basalibus raris minutis vix 2 cent. longis cuneato-ovatis apice crenatis, lobulis linearibus paucis obtusiusculis aut acutis suffultis; foliis caulinis numerosis, infimis pedunculatis versus apicem dilatatis et trilobis, subauriculatis, ceteris sessilibus, integris, lineari-lanceolatis 1 aut 1 ½ cent. longis obtusiusculis aut acutis, omnibus uti tota planta adpresse albido-tomentosis.

Capitulis numerosissimis globosis 3 ad 6 mill. latis pedunculatis deflexis, pedunculo tenuissimo ½ cent. longo bracteis linearibus suffulto.

Involucro tomentoso, squamis exterioribus æquilongis obtusissimis margine squarrosis.

Floribus luteo-brunneis, marginalibus uti videtur foemineis (?)

Differt ab A. Absinthio habitu scopario, foliis parvis angustis fere omnibus simplicibus, partim acutiusculis, capitulis multo minoribus.

A. vallesiaca capitulis erectis ovatis foliis compositis angustissimis abunde differt.

Isérables, le 5 août 1918, leg. Besse.
